Небулайзерная терапия в пульмонологии и интенсивной терапии

АВДЕЕВ С.Н.

ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ И.М.СЕЧЕНОВА

ERS/ISAM TASK FORCE REPORT

Что «легочный специалист» должен знать о НОВЫХ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ПРЕПАРАТАХ

B.L. Laube, H.M. Janssens, F.H.C. de Jongh, S.G. Devadason, R. Dhand, P. Diot,
M.L. Everard, I. Horvath, P. Navalesi, T. Voshaar and H. Chrystyn

Хорошая координация		Плохая координация	
PIFR $\leq$ 30 л/мин	PIFR $>$ 30 л/мин	PIFR $\leq$ 30 л/мин	PIFR $>$ 30 л/мин
ДАИ НЕБУЛАЙЗЕР	ДАИ, ДПИ НЕБУЛАЙЗЕР	ДАИ + спейсер НЕБУЛАЙЗЕР	ДАИ + спейсер ДПИ НЕБУЛАЙЗЕР

История аэрозольной доставки лекарственных препаратов

Первый компрессорный небулайзер¹

- Портативный
- С ручным приводом

Дозированный ингалятор³

- Портативный
- Удобство множества доз
- Для порошковых необходим пропеллент

Генератор аэрозолей с вибрационной сеткой (МЭШ небулайзер)⁵

- Тихий
- Низкая остаточная потеря лекарственного средства
 - Постоянный размер капель
- Растворы и суспензии аэрозолей

Электрический настольный небулайзер^{1,2}

- Назывался 'Пневмостат'
- Дорогой

Ультразвуковой небулайзер⁴

- Ультразвуковая электронная доставка
 - Тихий
- Портативный

Преимущества доставки препаратов в лёгкие при респираторной патологии

- Быстрый клинический ответ
- Снижение риска системных нежелательных явлений
- Доставка лекарственного средства в высоких концентрациях прямо в очаг поражения
- Обходит барьеры на пути к терапевтической эффективности (например, метаболизм первого прохождения через печень)
- Терапевтический эффект, аналогичен или превосходит системное введение препарата, при меньшей дозе

Преимущества доставки препаратов в лёгкие при респираторной патологии

Неинвазивный способ доставки

Подходит для широкого круга лекарственных средств

Обширная поверхность для абсорбции с высокопроницаемым барьером

Низкая ферментативная среда; избегает метаболизма первого прохождения через печень

Эффективно доставляет большие молекулы с очень низкой скоростью поглощения

Факторы влияющие на аэрозольную доставку препаратов

Анатомическое строение лёгких¹

- Геометрия дыхательных путей
- Разветвление / сужение дыхательных путей
- Влажность в легких
- Мукоцилиарный клиренс

Устройство²

- Тип устройства
- Остаточный объем
- Расположение аэрозольного устройства в вентиляционном контуре
- Прерывистое / непрерывное распыление

Воздушный поток / физика аэрозолей

- Скорость инспираторного потока²
- Размер частицы аэрозоля³
- Скорость аэрозоля³

Пациент

- Уровень взаимодействия с пациентами (например, плач у детей)^{4,5}
- Возраст пациента⁶

Способ доставки лекарственного препарата и сравнение эффективности

Небулайзеры с вибрирующей
мембраной (mesh): технология

Технология вибрирующей мембраны

Вибрирующая пористая пластина

Поперечное сечение пластины

Пьезокольцо вибрирует диафрагменной пластиной 128000 раз в секунду.

Создает микронасос, который образует мелкодисперсный аэрозоль из капель постоянного размера

Преимущества технологии вибрирующей мембраны

- Оптимальный размер частиц для высокой депозиции в легких
- Минимизирует капли в цепи
- Создается аэрозоль с низкой скоростью
- Поддерживает целостность препарата
- Нет тепла

Технология вибрирующей мембраны производит частицы аэрозоля размером 1–5 мкм, что оптимально для депозиции в легких.

Ингаляционная терапия пациентов на механической вентиляции

Ингаляционная терапия во время ИВЛ

Традиционные струйные небулайзеры (СН) при механической вентиляции (МВ)

Неинтубированные пациенты

Интубированные пациенты

	Intubated Subjects	Nonintubated Subjects
Administered radioactivity	5.75 ± 1.3 mCi	6.53 ± 0.4 mCi
Percent of administered radioactivity in:		
Trachea (includes portion of endotracheal tube in intubated patients)	1.6 ± 1.1% ^a	0.3 ± 0.1% ^a
Lung parenchyma	2.9 ± 0.7% ^b	11.9 ± 2.2% ^b
Stomach	—	7.3 ± 2.05%
Oral cavity	—	15.0 ± 13%
Nebulizer circuitry	—	65.5 ± 16%

Депозиция при использовании СН во время МВ всегда была проблемой
3% доставленной для интубированных пациентов по сравнению с 12% для неинтубированных пациентов

МESH небулайзер (VMN) и струйный небулайзер (СН) во время механической вентиляции

Доставка лекарственного средства была значительно лучше при использовании увлажнителя с VMN, тогда как размещение не имело большого значения для СН.

VMN технология доставляла больше лекарственного средства при размещении на сухой стороне увлажнителя по сравнению с тройником в модели механической вентиляции ($p < 0,05$)

- a. The JN was placed close to ventilator and prior to heated humidifier, and Aerogen® Solo was placed at humidifier inlet; Results shown are for 2/L min bias flow .
- b. The JN was placed 15cm from the Wye and the Aerogen Solo was attached between the Wye and the circuit.

Ингаляционная терапия пациентов на НВЛ

Мембранные небулайзеры (Aerogen, NIVO/Pro-X) для аэрозольной терапии во время НВЛ

МESH небулайзер доставляет больше препарата, чем струйный небулайзер независимо от расположения на взрослой модели пациента с ХОБЛ И НВЛ

Доставка препарата была выше в том случае, когда МESH небулайзер был помещён у порта сброса на стороне пациента vs на стороне вентилятора

Дизайн исследования

Субъект/ модель:

Взрослые с ХОБЛ и НВЛ

Лечение: 2,5 мг/мл сульфата тербуталина с доставкой с помощью МESH небулайзера и струйного небулайзера

Цель: определить влияние на легочную доставку аэрозольного препарата месторасположения в контуре вентилятора устройства для небулизации аэрозоля

МESH небулайзер обеспечивает большую депозицию препарата, чем струйный небулайзер в обоих расположениях

МESH небулайзер доставляет больше препарата в дыхательные пути, чем струйный небулайзер во время НВЛ у здоровых

Во время НВЛ МESH небулайзер в сравнении со струйным небулайзером доставляет в дыхательные пути в 3 раза и более препарата с радиоактивной меткой

Сцинтиграфические изображения выполненные во время НВЛ с применением МESH небулайзера (А) и

Дизайн исследования

Субъекты/модель: Поперечное клиническое исследование с включением 10 здоровых добровольцев

Лечение: 99mTc-DTPA (25 mCi/3 ml) доставлялся с помощью МESH небулайзера или струйного небулайзера

Цель: Сравнение депозиции радиоаэрозоля в легких и экстрапульмонарных отделах при использовании МESH небулайзера и струйного небулайзера

Остаточной объем препарата был значительно ($p=0.005$) ниже в МESH небулайзере, чем в струйном небулайзере

НВЛ у пациентов с ХОБЛ: сравнение между МЕШ небулайзером и СН

- 9 пациентов со стабильным среднетяжелым и тяжелым ХОБЛ
- Перекрестное исследование: МЕШ или СН
- НВЛ: 12 / 5 см H₂O
- Оронозальная маска

Deposition (%)	3.14 ± 1.71	12.05 ± 2.96	0.008
----------------	-------------	--------------	-------

Технология вибрирующей мембраны обеспечивает доставку в дыхательные пути почти в 4 раза больше препарата в сравнении со струйным небулайзером при проведении НВЛ у пациентов с ХОБЛ

Клинические исходы при ХОБЛ: сравнение между МЕШ небулайзером и СН при проведении НВЛ

- Проспективное рандомизированное перекрестное исследование (n=30) пациентов со стабильной ХОБЛ (после выхода обострения)
- Пациенты были выборочно распределены на две лечебные группы, каждая из которых получала сальбутамол (2.5 mg):
 - МЕШ небулайзер vs СН при проведении НВЛ с односторонним контуром располагался между портом сброса и невентилируемой ороназальной маской

Клинические исходы при ХОБЛ: сравнение между МЕШ небулайзером и СН при проведении НВЛ

Клинические исходы при ХОБЛ: сравнение между МЕШ небулайзером и СН при проведении НВЛ

Проспективное рандомизированное перекрестное исследование (n=30) пациентов со стабильной ХОБЛ (после выхода обострения)

Пациенты были выборочно распределены на две лечебные группы, каждая из которых получала сальбутамол (2.5 мг):

- МЕШ небулайзер vs СН при проведении двухуровневой вентиляции с односторонним контуром располагался между портом сброса и невентилируемой ороназальной маской

В обеих группах было улучшение по параметру PaCO₂, но в случае применения МЕШ небулайзера эти изменения были значительно более выраженными

Ингаляционная терапия при
высокопоточной назальной
оксигенации с помощью
канюли

Мембранные небулайзеры (Aerogen) для аэрозольной терапии во время HFNC

Mesh-небулайзеры и ВПНОК: здоровые взрослые

**Скорость
потока**

10 л/мин

30 л/мин

50 л/мин

Легкое %

11.8 ± 4.9

3.76 ± 1.36*

2.23 ± 0.81*

*p<0.05 против 10 л/мин

Сцинтиграфическая и количественная легочная депозиция в условиях нагрева при различных скоростях потока

- Вибрирующая мембрана обеспечила более выраженную легочную депозицию на низких скоростях потока

ВПНОК: Mesh-небулайзеры vs СН у 6 здоровых взрослых

- Доставка радиационно меченного аэрозоля, сравнивая МЕШ небулайзера и СН через ВПНОК, у 6 здоровых взрослых на скорости потока 30 л/мин
- Оба небулайзера находятся с сухой стороны увлажнителя
- Легочная депозиция: 3.6% и 1% от номинальной дозы с МЕШ небулайзером и СН соответственно ($p < 0.05$)

Изображение показывает радиоактивно меченое отображение аэрозоля, введенного с помощью МЕШ небулайзера здоровому субъекту

- МЕШ небулайзер обеспечивает более значимую доставку аэрозоля в сравнении со СН при ВПНОК на скорости 30 л/мин
- Более высокий остаточный объем оставался у СН 45% против 2.6 % у МЕШ небулайзера

Бронходилатация во время ВПКТ: рандомизированное перекрестное исследование

•25 пациентов с документально подтвержденной обратимой обструкцией ДП получали 2,5 мг сальбутамола с помощью:

- Стандартное применение небулайзера (СН с маской)
- **ВПКТ + Распыление МЕШ небулайзером в катетер ВПНОК (с помощью адаптера для небулайзера) при 30 л / мин**
- Только ВПНОК при 30 л / мин [контроль]

Первичная конечная точка: изменение ОФВ1 после доставки аэрозоля.

Доставка сальбутамола с МЕШ небулайзером во время ВПНОК индуцирует аналогичную бронходилатацию в сравнении со СН с маской. Сам по себе ВПКТ может вызвать небольшое, но значимое расширение бронхов.

Ингаляционная терапия у пациентов без респираторной поддержки

ВМН у спонтанно дышащих пациентов

VMH был более эффективным, чем СН в модели спонтанного дыхания у взрослых

VMH доставил почти в 8 раз большую дозу препарата в легкие по сравнению с СН

Дизайн исследования

Модель: модели спонтанного дыхания у здоровых взрослых и больных ХОБЛ

Лечение: 4 мг сальбутамола (2 мг / мл) доставляется через VMH с помощью маски для лица с клапанами или СН с открытой лицевой маской.

Цель: сравнить дозу и скорость доставки лекарств двух устройств для доставки аэрозолей в модели дыхания, имитирующей нормального пациента и одного, испытывающего обострение ХОБЛ.

VMH доставил значительно больше лекарств и почти вдвое быстрее обычного СН

*P=0.008; **P=0.005; Both P Values Vs VMH.

COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Jn, Jet Nebuliser

Hickin et al. Poster At The College Of Emergency Medicine Clinical Excellence Conference 2014

Введение бронходилататора с помощью небулайзера с вибрирующей мембраной (ВМН) и стандартного струйного небулайзера (СН) в отделении неотложной помощи

Дизайн исследования

- Сравнение ВМН или традиционного струйного небулайзера (стандарт терапии)
- Отделение неотложной помощи больницы Святого Иоанна, Детройт, США
- Все возрастные группы пролечены
- Рассмотрено 1594 карт (715 ВМН и 879 СН)

- Цели исследования: Влияет ли тип устройства для доставки аэрозоля на:
 - Тарифы приема в отделение неотложной помощи
 - Время в отделение неотложной помощи
 - Общая доза сальбутамола

МЕШ небулайзер ассоциирован с лучшими исходами

Уровень госпитализации в отделении неотложной помощи на 32% меньше с ВМН, чем с традиционным СН

37-минутное среднее снижение (13%) среднего пребывания в стационаре на пациента с ВМН по сравнению с СН

Требуемая доза салъбутамола

Дозировка салъбутамола значительно ниже с МЕС-небулайзером (BMH)

Использование ВМН амбулаторными пациентами с обострением ХОБЛ: клинические результаты

- Обострение ХОБЛ в течение недели после поступления
- 32 пациента рандомизированы в:
- СН с открытой маской
- ВМН с мундштуком
- Лечение 2,5 мг сальбутамола и 0,5 мг ипратропия бромидом (разовая доза)
- Функциональный тест легких, выполняемый на исходном уровне (утром до приема препарата) и через 1 час после лечения

Результаты

Первичная точка: емкость вдоха изменилась в большей степени в группе ВМН, но не была статистически значимой.

Группа Ultra имела статистически значимое улучшение ФЖЕЛ по сравнению с группой СН.

Ингаляционная терапия в период COVID-19

Безопасное лечение бронходилататорами у пациентов с COVID-19 на ИВЛ: опыт единого центра

- Сообщается об использовании непрерывной ингаляции Aerogen Solo у пациентов с COVID-19, страдающих ХОБЛ и астмой, на инвазивной и неинвазивной вентиляции
- Авторы заявили, что эта закрытая система требует минимального обслуживания персонала и не требует размыкания цепи, что снижает рабочую нагрузку и повышает безопасность.
- Это первый отчет о безопасном и эффективном применении бронходилататоров пациентам, находящимся на ИВЛ.

Консенсус экспертов по респираторной терапии в связи с новой коронавирусной инфекцией у тяжелых и критических пациентов

- Консенсус китайских экспертов относительно снижения передачи вируса во время лечения респираторных заболеваний у пациентов, инфицированных COVID-19
- Пациентам с COVID-19 на ИВЛ, которым требуется ингаляционная терапия, рекомендуется использовать небулайзер с вибрирующей мембраной.
- Дополнительный фильтр, устанавливаемый на выходном отверстии вентилятора во время распыления
- Небулайзер с вибрирующей мембраной должен быть расположен на сухой стороне увлажнителя.

Ингаляционная терапия сурфактантом в комплексном лечении тяжелой формы COVID-19-пневмонии

А. Е. БАУТИН¹, С. Н. АВДЕЕВ², А. А. СЕЙЛИЕВ³, М. В. ШВЕЧКОВА⁴, З. М. МЕРЖОЕВА², Н. В. ТРУШЕНКО², А. П. СЕМЕНОВ¹,
К. Б. ЛАПШИН¹, О. А. РОЗЕНБЕРГ³

Пациенты, получавшие O2-терапию

122 пациента
1-й МГМУ им. И.М. Сеченова (28)
НМИЦ им. В.А. Алмазова (28)

Заключение

Общие выводы исследований ВМН

- Эффективная доставка ингаляционных лекарств во время всей вентиляции легких в больнице, включая пациентов со спонтанным дыханием
- Оптимальная депозиция в легких при всей вентиляционной поддержке
- Улучшение функции легких у пациентов на ИВЛ и без интубации
- В отделении неотложной помощи можно увидеть рентабельность в отношении сокращения продолжительности пребывания и количества поступающих.

СПАСИБО!